

Некоторые аспекты внекишечных проявлений язвенного колита у детей в Азербайджанской Республике

Гидаятова Л.А., Мамедова Ф.М., Гаджиева У.К.

Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджанская Республика

Актуальность. Язвенный колит является одной из социально значимых проблем современной гастроэнтерологии, причем почти в 50% случаев данная патология имеет разнообразные внекишечные проявления, определяющие тяжесть и прогноз заболевания.

Цель исследования. Изучение характера и частоты внекишечных проявлений язвенного колита у детей в Азербайджанской Республике.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 40 детей в возрасте 10–18 лет с подтвержденным диагнозом язвенного колита, имеющие различные внекишечные проявления. Среди обследованных были 22 (55%) девочки и 8 (45%) мальчиков.

Результаты. В результате обследования наряду с классическими проявлениями язвенного колита у 16 (40%) пациентов имелись суставные проявле-

ния, причем у 12 (75%) из них были периферические артриты, у 3 (18,75%) — односторонний сакроилеит и у 1 (2,5%) — анкилозирующий спондилит. Также у 5 (12,5%) пациентов наблюдалась мышечная слабость различной степени интенсивности. Среди обследованных у 3 (7,5%) пациентов была диагностирована гангренозная пиодермия и у 2 (5%) — узловатая эритема. Помимо этого, у 11 (27,5%) больных имелись различные поражения глаз, у 2 (5%) — склерозирующий холангит и у 1 (2,5%) наблюдался аутоиммунный гепатит.

Заключение. Таким образом, язвенный колит у детей достаточно часто имеет внекишечные проявления, ухудшающие качество жизни пациентов и прогноз самого заболевания, что требует более тщательного подхода к ранней диагностике и своевременной терапии данной патологии.