



Особенности фармакоэпидемиологии аллергического ринита у детей, проживающих на территории Волгоградской области

Наumenko M.Л.

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград,
Российская Федерация

Актуальность. В разных странах мира аллергическим ринитом (АР) страдают более 40% населения, в России — 10–24% населения. АР является одним из наиболее частых аллергических заболеваний, с которым жители Волгоградского региона обращаются к врачам амбулаторного звена.

Цель исследования. Оценить структуру обращаемости педиатрической группы пациентов с АР к врачам разных профилей и установить тенденции фармакотерапии данного заболевания.

Пациенты и методы. Проанализированы данные ТФОМС Волгоградской области о количестве первичных и повторных обращений пациентов в возрасте до 18 лет с диагнозом АР (J30.1, J30.2, J30.3 J30.4) в учреждения амбулаторного звена в течение 2019–2020 гг.; проведена оценка структуры обращаемости пациентов к специалистам разных профилей. Анализ фармакотерапии АР выполнен в соответствии с международными рекомендациями ARIA-2019.

Результаты. Число первичных обращений пациентов с диагнозом АР в течение 2019–2020 гг. составило 22527 случаев. Среди них 50% (11 269/22527) пациентов впервые выставлен данный диагноз врачами аллергологами-иммунологами; оториноларинголога-

ми и педиатрами — в 27,2% (6127/22527) и 22,8% (2278/22527) случаев соответственно.

Повторных обращений пациентов зарегистрировано 8491 случаев (37,7% от числа первичных обращений). Последующим контролем АР занимаются аллергологи-иммунологи в 85% (7218/8491) случаев. Повторных обращений к оториноларингологам — 7,2% (613/8491); к педиатрам — 7,8% (661/8491).

Наиболее часто назначаемыми препаратами для лечения АР являются антигистаминные препараты (АГП) — 91,6% пациентов. Среди АГП преимущественно назначались АГП II поколения — в 83,3% случаев, в то же время АГП I поколения назначались в 13,3% случаев. Вторыми по частоте назначений являются ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) — 86,6% пациентов. Антилейкотриеновые препараты были назначены 23,3% пациентов; кромоны — 4,4% пациентов с АР.

Заключение. Фармакотерапия АР врачами аллергологами-иммунологами, оториноларингологами и педиатрами преимущественно осуществляется в соответствии с международными рекомендациями. Отмечается низкая (менее 40%) повторная обращаемость пациентов с АР к специалистам амбулаторного звена.